

## أنازول (مترونيدازول)

### الخواص

أنازول هو دواء مشتق من مجموعة نيتروإميدازول ذو تأثير مضاد للاوالي والبكتيريا. يمتص أنازول جيداً بعد تناوله عن طريق الفم وتوافره الحيوي يقارب 100%. يظهر أنازول في معظم أنسجة الجسم وسوائله بتركيزات مشابهة لتلك التي في المصل. معظم جرعة أنازول تطرح في البول. أنازول فعال ضد عدد من الجراثيم تشمل: المشعرة المهبلية، الأميبية الحالة للانسجة، البكتيرويدات، كلوستريديا، فيوسوبكتيريم، جيارديا لامبليية، المكورات الببتيدية، المكورات السبجية الببتيدية.

### دواعي الاستعمال

التهاب الجهاز التناسلي والبولي الناتج عن وحيدات المشعرة، الاصابات المهبلية الجرثومية، الاميبا المعوية والكبدية، الالتهابات الناتجة عن الجيارديا، عدوى قنسننت (التهاب اللثة الحاد المتقيح)، والالتهابات الناتجة عن البكتيريا اللاهوائية. وكذلك يستعمل أنازول مع أدوية أخرى لعلاج القرحة الهضمية الناتجة عن هليكوباكتر بيلوري.

### الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم

-التهاب الجهاز التناسلي والبولي الناتج عن وحيدة المشعرة:

الكبار : ٢ جم من أنازول تعطى كجرعة واحدة أو في جرعتين متساويتين، أو ٢٥٠ ملجم ٣ مرات يومياً لمدة ٧ أيام متتالية. لا ينبغي استعمال طريقة المعالجة ليوم واحد للحوامل في الثلاثة أشهر الثانية أو الثالثة من الحمل.

ينبغي معالجة كلا الزوجين بنفس الوقت.

الاطفال : ٥ ملجم / كجم من وزن الجسم، ٣ مرات يومياً لمدة ٧ أيام.

-الاصابات المهبلية الجرثومية :

٥٠٠ ملجم مرتين يومياً لمدة ٧ أيام. ينبغي معالجة كلا الزوجين بنفس الوقت.

-الاميبا المعوية والكبدية :

الكبار : ٧٥٠-٥٠٠ ملجم ٣ مرات يومياً لمدة ٥-١٠ أيام.

الاطفال : ٣٥-٥٠ ملجم / كجم من وزن الجسم يومياً مقسمة الى ٣ جرعات لمدة ١٠ أيام.

-الالتهابات الناتجة عن الجيارديا:

الكبار : ٢ جم كجرعة واحدة يومياً لمدة ٣ أيام أو ٢٥٠ ملجم ٣ مرات يومياً لمدة ٧-٥ أيام.

الاطفال : ١٥ ملجم / كجم من وزن الجسم يومياً مقسمة على ٣ جرعات لمدة ٥-٧ أيام.

-الالتهابات الناتجة عن البكتيريا اللاهوائية :

الكبار : ٥٠٠ ملجم كل ٨ ساعات.

الاطفال : ٢٠-٣٠ ملجم / كجم من وزن الجسم يومياً مقسمة الى ٣-٤ جرعات.

-لعلاج القرحة الهضمية الناتجة عن هليكوباكتر بيلوري : ٢٥٠ ملجم ٤ مرات يومياً مع أدوية أخرى.

### مضادات الاستعمال

شدة الحساسية للمترونيدازول. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

### المحاذير

ظهور أعراض عصبية غير طبيعية تتطلب التوقف الفوري عن استعمال المترونيدازول. ينبغي استعمال المترونيدازول بحذر لدى المرضى الذين سبق

وان أصيبوا بالتشنجات أو يعانون من أمراض الجهاز العصبي المركزي . يجب تجنب تناول المشروبات الكحولية خلال فترة المعالجة . ينبغي استعمال المترونيدازول بحذر لدى المرضى الذين يعانون من حثل الدم . ينبغي استعمال المترونيدازول بحذر لدى المرضى الذين يعانون من فشل كلبي وينبغي تقليل الجرعة في الحالات الشديدة . وينبغي أيضاً تقليل الجرعة للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي شديد ( تصفية الكرياتينين أقل من ١٠ مل / دقيقة ) .

#### الاحتياطات

وجد أن المترونيدازول يقوي من مفعول مضادات التخثر (مثل الوارفارين وغيره) . قد يخفي المترونيدازول أعراض وجود مرض الزهري . ينبغي تجنب استعمال المترونيدازول خلال فترة الارضاع . قد يظهر البول بلون أحمر قاتم خلال العلاج .

#### التأثيرات الجانبية

التأثيرات الجانبية للمترونيدازول نادرة وفي العادة خفيفة وقد تشمل الاضطرابات الهضمية (مثل الغثيان، الاسهال، طعم معدني في الفم)، صداع، دوام، طفح جلدي .

#### الجرعة الزائدة

في حالة الجرعة الزائدة، يجب معالجة الاعراض واتخاذ الاجراءات الداعمة .

#### ظروف التخزين:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (أقل من ٢٥ ° مئوية) .

#### الاشكال الصيدلانية

#### أقراص

أنازول ٢٥٠ : مترونيدازول دستوربريطاني ٢٥٠ ملجم / قرص .

أنازول ٥٠٠ : مترونيدازول دستوربريطاني ٥٠٠ ملجم / قرص .

#### سُعلق

أنازول ١٢٥ : مترونيدازول (على شكل بنزوات) دستوربريطاني ١٢٥ ملجم / ٥ مل .

أنازول ٢٠٠ : مترونيدازول (على شكل بنزوات) دستوربريطاني ٢٠٠ ملجم / ٥ مل .

#### ان هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلالاً للتعليمات بعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصلة الطبيب وطريقة الاستعمال للتخصص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- ان الطبيب والصيدلاني هما الحيران بالدواء وينفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب .

لا تترك الادوية في متناول ايدي الاطفال